


ВІТРЯНА ВІСПА · WINDPOCKEN




1. Симптоми: приблизно через 2 тижні після контакту спостерігається короткочасна лихоманка та виснаження. Потім з'являється червоний сверблячий висип. Незабаром з нього утворюються пухирці. Ускладнення: рідко може призводити до тяжкого запалення мозку.

2. Ризик зараження: Вітряна віспа дуже заразна. Вона передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі чи чханні або через рідину в пухирцях. Вони заразні за 2 дні до появи висипу і до 5 днів після появи висипу, поки всі пухирці не покриються кіркою.




3. Захист: Захистити себе та інших можна, зробивши щеплення.

4. Це захворювання потребує сповіщення. Це зробить ваш лікар.



5. Заходи:


Спочатку зателефонуйте в педіатричну практику.



Візьміть з собою книжку вакцинації вашої дитини.




Дотримуйтесь вказівок лікаря.



ВІТРЯНА ВІСПА · WINDPOCKEN

6. Такими рекомендаціями можуть бути:


- Небажаний особистий контакт з невакцинованими, незахищеними або імунодефіцитними людьми.
- Небажаний особистий контакт з вагітними жінками.



- Постільний режим
- Не дряпати.
- Коротко обрізати нігті.
- Не митися.

Проти сверблячки:

- Трохи прохолодна кімнатна температура.
- Легка, не дуже облягаюча білизна.



- Повідомте про захворювання вашої дитини у дитячий садок, ясла чи школу. Якщо це заразне захворювання або захворювання, яке потребує сповіщення, вкажіть захворювання, щоб вихователі могли захистити інших дітей, якщо це необхідно.



- Дитина може повернутися в садок або в школу після зникнення ознак хвороби. Запитайте свого педіатра.

